



# XX CONGRESSO BRASILEIRO DE PALEONTOLOGIA

21 A 26 DE OUTUBRO DE 2007 - BÚZIOS

# ANAIS

**A PALEONTOLOGIA CELEBRANDO A VIDA**



## O GÊNERO *ARARIPEMYS* (*CHELONII*, *PLEURODIRA*) NO CRETÁCEO BRASILEIRO

### *THE ARARIPEMYS (CHELONII, PLEURODIRA) IN THE BRAZILIAN CRETACEOUS*

Diogo Lins Batista & Ismar de Souza Carvalho <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Geociências, Departamento de Geologia  
Av. Athos da Silveira Ramos, 274 - Cidade Universitária, 21910-900 – Ilha do Fundão –  
Rio de Janeiro, RJ – Brasil

<sup>1</sup>*linsbatista@yahoo.com.br*, <sup>2</sup>*ismar@geologia.ufrj.br*

No Brasil é encontrada uma espécie de *Araripemys* (*Chelonii*, *Pleurodira*), distribuída nas bacias do Araripe e Parnaíba. Na Bacia do Araripe, *Araripemys barretoii* Price, 1973, provém dos membros Crato e Romualdo da Formação Santana (Aptiano-Albiano). Na Bacia do Parnaíba ocorre na Formação Itapecuru (Aptiano-Albiano). O fato de espécimes de *A. barretoii* estarem presentes nas duas bacias, provavelmente, indica a existência de uma província paleobiogeográfica para estes quelônios pleurodiras na região meio-norte do Brasil durante o Cretáceo Inferior.